

Radziejów, dnia 26 czerwca 2026 r.



INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W RADZIEJOWIE

Wg rozdzielnika

Nasz znak: PIW.R.Z.149.2026

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie uprzejmie przypomina, że trwa okres wzmożonego ryzyka pojawienia się ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach utrzymujących świnie. Główną przyczyną wzrostu ilości zakażeń ASF u świń od maja do października jest intensyfikacja prac polowych w tych miesiącach. Stałe występowanie choroby w populacji dzików, oznacza największą koncentrację wirusa w obszarach leśnych i na polach. W konsekwencji sezon letni sprzyja przenoszeniu wirusa ASF z lasów i pól na teren gospodarstw wraz z człowiekiem czy pojazdami powracającymi z pola.

W celu ograniczenia ryzyka zakażenia świń wirusem ASF w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie powinny być wdrożone i stale utrzymywane wszystkie podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt przed przypadkowym przeniesieniem czynników zakaźnych w sposób mechaniczny:

- ✓ Niekupowanie świń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego - w przypadku wielu stwierdzonych ognisk jako przyczynę przeniesienia zakażenia wirusem ASF, na podstawie wyników dochodzeń prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Policję, wskazuje się nielegalną działalność człowieka;
- ✓ Nieskarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
- ✓ unikanie kontaktu z padłymi świniami (lub dzikami) - w przypadku kontaktu z padłą swinia lub dzikiem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie;
- ✓ zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych i dziko żyjących;
- ✓ utrzymywanie świń w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne;
- ✓ zabezpieczenie budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki przed dostępem zwierząt dzikich (w tym gryzoni);
- ✓ rezygnacja z udziału w polowaniach;
- ✓ niewnoszenie do gospodarstw części tusz i skóry dzików;
- ✓ zachowanie podstawowych zasad higieny:
 - odkażanie rąk i obuwia,



- stosowanie odzieży ochronnej i narzędzi pozostawianych w budynku inwentarskim po zakończeniu prac,
- okresowe odkażanie odzieży ochronnej i narzędzi;
- ✓ zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;
- ✓ uniemożliwienie osobom postronnym (nie zajmującym się zawodowo zwierzętami lub leczeniem zwierząt w danym gospodarstwie) wchodzenia - zwłaszcza po kontakcie z padłą świnią lub dzikiem - do budynków inwentarskich w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie.

Objawy afrykańskiego pomoru świń mogą być niespecyficzne, podobne do innych chorób lub zatruc, mogą być różne w różnych gospodarstwach.

Następujące objawy zawsze powinny zaniepokoić hodowcę:

- ✓ nagłe padnięcia świń - ASF w stadzie świń może niekiedy objawić się jedynie nagłymi padnięciami, bez innych objawów towarzyszących;
- ✓ wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała (do 40,5-42°C), któremu nie muszą towarzyszyć inne symptomy (gorączkujące świnie mają czasem zachowany apetyt, poruszają się na ogół normalnie);
- ✓ inne objawy kliniczne, które mogą dołączyć do gorączki:
 - sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała,
 - drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze,
 - zaczerwienienie skóry widoczne zwłaszcza na końcach uszu, ogona i kończynach,
 - duszność,
 - pienisty wypływ z nosa,
 - wypływ z worka spojówkowego,
 - biegunka - często z domieszką krwi,
 - wymioty,
 - niedowład zadu,
 - objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych,
 - ronienia u prośnych macior;
- ✓ niekiedy gorączce mogą towarzyszyć posmutnienie, utrata apetytu, szybkie i trudne oddychanie oraz zaleganie wydaliny z nosa i oczu, wymioty, zaparcia, krwista biegunka, przed śmiercią może nastąpić śpiączka, która pojawia się jeden do siedmiu dni po wystąpieniu pierwszych objawów klinicznych.

Świnie zakażone wirusem afrykańskiego pomoru świń często wykazują objawy chorobowe podobne do objawów innych chorób (gorączka, wybroczyny, apatia, poronienia, padnięcia bez innych wyraźnych objawów) dlatego w przypadku najmniejszego podejrzenia lub nawet domniemania możliwości wystąpienia ASF w stadzie, przede wszystkim na obszarach, na których choroba występuje lub w sąsiedztwie tych obszarów, należy zgłosić podejrzenie ASF do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii celem umożliwienia pobrania próbek w kierunku wykluczenia ASF. Zgłoszenie należy przekazać bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu



samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie prosi o rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym piśmie wśród hodowców świń w sposób zwyczajowo przyjęty.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W RADZIEJOWIE
Anna Pułkownik
Anna Pułkownik

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
2. Urząd Gminy Radziejów ul Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
3. Urząd Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre
4. Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kuj.
5. Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka
6. Urząd Gminy Bytoń 72, 88-231 Bytoń
7. Urząd Gminy Osiećciny, ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osiećciny
8. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Przemystka 23, 88-200 Radziejów
9. Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział w Radziejowie, Przemystka 23, 88-200 Radziejów
10. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, Przemystka 23, 88-200 Radziejów
- 11.aa

Wysłano drogą elektroniczną.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Brzeska 53, 88-200 Radziejów
tel. (54) 285-35-10, fax.: (54) 285-48-03, e-mail: sekretariat@piwradziejow.pl, bip.piwradziejow.pl

